

DOLO NEUROCOM AC



Registro: Q-7792-100
Analgésico, antiinflamatorio y antipirético en polvo soluble oral. Ácido acetilsalicílico al 40%

FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:

Ácido acetilsalicílico.....40 g
Vehículo c. b. p. 100 g

DESCRIPCIÓN:

DOLO NEUROCOM AC es una formulación en polvo soluble, segura que puede ser administrada en el agua de bebida o alimento balanceado del animal. Gracias a su forma farmacéutica:

En aves se recomienda para realizar tratamientos post-vacunales (vacunas oleosas inyectables) y en caso de diferentes condiciones patológicas respiratorias y estrés calórico. En ponedoras comerciales está indicado en corte de picos de pollitas y traslados.

En cerdos se recomienda como coadyuvante en casos de enfermedades virales, Enfermedades respiratorias, Mastitis, Metritis y Agalactia, patologías del sistema locomotor. También está indicado para reducir los efectos secundarios de las vacunaciones (antipirético).

En Bovinos está indicado como coadyuvante en enfermedades respiratorias y del sistema locomotor.

INDICACIONES:

DOLO NEUROCOM AC está indicado para reducción del dolor, reducción de la temperatura corporal y como coadyuvante en tratamientos con antibacterianos. Actúa disminuyendo la fiebre; también tiene un efecto analgésico e antiinflamatorio y ayuda a recuperar el apetito y a mejorar el estado sanitario del animal. Muy adecuado como preventivo frente al estrés calórico y a los problemas de hipertermia / pirexia.

Como auxiliar durante los procesos de transporte, tensión térmica ambiental, vacunaciones, recepción de reemplazos, así como durante el curso de enfermedades y su convalecencia.

DOSIS: LA DOSIS APROBADA EN LA ETIQUETA DE ECOSIN® ES:

Aves y cerdos: 1 g por cada litro de agua de bebida durante 3 a 5 días según el estado de los animales. 1 kg por tonelada de alimento durante 3 a 5 días.

Bovinos: 10 a 100 mg por kg de peso cada 12 horas.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, en el agua de bebida o en el alimento.

PRESENTACIÓN:
Saco de 10 y 25 kg



ADVERTENCIAS:

- No consumir la carne y leche hasta 24 horas después del tratamiento.
- Conserve el producto en lugar fresco, seco y no expuesto a la luz.
- No se deje al alcance de los niños y de animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
- Consulte al médico veterinario
- Su venta requiere receta médica

