

DOLO NEUROCOM PC



Registro: Q-7792-098
Paracetamol al 10% en premezcla para uso en cerdos

FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:

Paracetamol.....10 g
Excipiente c. b. p. 100 g

DESCRIPCIÓN:

El paracetamol, o acetaminofeno, es un derivado del para-aminofenol con propiedades analgésicas y antipiréticas. Su efecto antipirético se explica por su capacidad de inhibir las ciclooxigenasas cerebrales. El paracetamol es un inhibidor débil de la síntesis de la COX-1 y, por tanto, no tiene efectos secundarios gastrointestinales ni sobre la agregación plaquetaria.

(0.3 g de **DOLO NEUROCOM PC** por kg de peso) (Peso promedio de los cerdos a tratar) =

mg de **DOLO NEUROCOM PC** / Kg de alimento / día

Peso promedio de ingesta diaria por alimento por animal (Kg)

Ejemplo: cerdos de hasta 50 Kg de peso con una ingesta de alimento de 900 g / día

(0.3 g de **DOLO NEUROCOM PC** por kg de peso) (50 Kg) = 16.6 g de **DOLO NEUROCOM PC** / Kg de alimento / día

0.900 Kg de alimento

La mezcla debe realizarse por personal autorizado y con un equipo de mezclado apropiado.

INDICACIONES:

DOLO NEUROCOM PC está indicado para el tratamiento sintomático, para reducir la piroxia en enfermedades infecciosas respiratorias agudas, en combinación con una terapia antiinfecciosa apropiada.

DOSIS: LA DOSIS APROBADA EN LA ETIQUETA DE ECOSIN® ES:

Dosis general 30 mg / Kg de peso vivo al día, durante 5 días consecutivos (equivalente a 300 mg de DOLO NEUROCOM PC por Kg de peso vivo al día). Para preparar el alimento medicado, se debe tener en cuenta el peso de los animales que se van a tratar y la ingestión diaria real del alimento. Para proporcionar la cantidad requerida de sustancia activa por kilogramo de alimento, la premezcla debe incorporarse en el alimento de acuerdo con la fórmula siguiente:

Para más información de nuestros productos:

 **33 3114 7767**

ventas@farmacomdemexico.com
farmacovigilancia:
contacto@farmacomdemexico.com
www.farmacodemexico.com



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

PRESENTACIÓN:
Saco de 10 kg

PERIODO DE RETIRO:

Carne: porcinos; 1 día.



ADVERTENCIAS:

- No usar en animales con hipersensibilidad conocida al paracetamol. Los animales con pérdida de apetito o alteración del estado general deben ser tratados por vía parental.
- No consumir la carne y leche hasta 24 horas después del tratamiento.
- Conserve el producto en lugar fresco, seco y no expuesto a la luz.
- No se deje al alcance de los niños y de animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
- Consulte al médico veterinario
- Su venta requiere receta médica

