

ALBENDAZOL 10%



Registro : Q- 0835-049
Polvo Premezcla

FÓRMULA:

Cada 1,000 g contienen:

Cada 1000 g contienen:

Albendazol.....100.0 g

Excipiente,c.b.p.....1,000.0 g

INDICACIONES:

Albendazol 10% está indicado para el control y tratamiento de las parasitosis que afectan el ganado como nematodos (*Ostertagia ostetargi*, *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodius spp.*, *Cooperia spp.*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesphagostomum spp.*, *Dictycaulus spp.*, que afectan principalmente a ovinos y caprinos), *trematodos* (*Faciola hepática*) y *cestodos* (*Moniezia spp.*). También esta indicado para el tratamiento de la *neurocisticercosis parenquimatosa*, debida a lesiones activas causadas por formas larvarias del platelminto porcino *Taenia solium*.

USO EN:

Bovinos (productores de leche y de engorda), porcinos, ovinos y caprinos.

DOSIS:

BOVINOS (PRODUCTORES DE LECHE Y ENGORDA):

Administrar una dosis única de 10 g de Albendazol 10% GV por cada 100 Kg de peso vivo.

PORCINOS:

Administrar una dosis única de 1 - 2 g de Albendazol 10% GV por cada 20 Kg de peso vivo.

OVINOS Y CAPRINOS:

Administrar una dosis única de 1.5 g de Albendazol 10% GV por cada 100 Kg de peso vivo.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.



PRESENTACIÓN:
Sacos de 25 Kg



ADVERTENCIAS:

- Almacenar en un lugar fresco, seco, protegido de la luz y a una temperatura menor de 25°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No usar este producto en Bovinos 27 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- El tiempo de retiro en ovinos para faena es de 2 días después de la última dosificación.
- No destinar para consumo humano la leche de los animales tratados hasta 3 días después de la última dosificación.
- Conserve el producto en lugar fresco, seco sobre tarimas y protéjase del sol.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
- USO VETERINARIO
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
- SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

