

AMOXI 500 PROTEC®



Registro :Q-7792-073
Premezcla Antibiótica

FÓRMULA:

Cada 1,000 g contienen:

- Amoxicilina trihidrato.....500 g
- Excipientes estabilizadores, c.b.p.....1000 g

INDICACIONES:

AMOXI 500 PROTEC es una premezcla antibiótica de amplio espectro a base de amoxicilina trihidrato protegida que le permite conservar su potencia durante el peletizado y no es afectada por el pH ácido del estómago. Eficaz para el tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas y reproductivas de los cerdos, aves y bovinos producidas por gérmenes Gram (+) y Gram (-) tales como:

Clostridium spp. Escherichia coli. Estaphilococcus spp. Streptococcus spp. Avibacterium paragallinarum. Pasteurella multocida. Salmonella spp. Proteus spp. Klebsiella spp. Haemophilus parasuis. Actinobacillus pleuropneumoniae. Actinobacillus suis. Mannheimia haemolytica. Erysipelothrix rhusiopathie. Corynebacterium spp. Bacillus anthracis, Serpulina hyodysenteriae.

USO EN (ENFERMEDADES):

Aves (engorda y reproductoras): artritis, sinusitis, salmonelosis, coriza, colibacilosis, gangrena cutánea, enteritis necrótica, enteritis inespecífica y estafilococosis.

USO EN:

Aves (engorda y reproductoras), Porcinos (lechones, desarrollo, engorda, hembras reproductoras y sementales) y Bovinos (becerros)

Porcinos (lechones, desarrollo, engorda, hembras reproductoras y sementales): estreptococosis, enfermedades de Glasser, actinobacilosis, artritis, MMA, nefritis, cititis, dermatitis.

Bovinos (becerros): onfalitis, enteritis infecciosa, enfermedades respiratorias, salmonelosis, colibacilosis, e infecciones urinarias.

DOSIS:

DOSIS GENERAL:

10 a 20 mg/ kg de peso.

AVES:

400 a 800 g de **AMOXI 500 PROTEC** / Ton de alimento por 7 días.

PORCINOS:

Porcinos: Adultos: 600 a 800 g de **AMOXI 500 PROTEC** / Ton de alimento durante 7 días.

LECHONES:

600 g de **AMOXI 500 PROTEC** / Ton de alimento por 7 días.

BOVINOS Y BECERROS:

500 a 750 g de **AMOXI 500 PROTEC** / Ton de alimento por 7 días.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento del animal.

PRESENTACIÓN:
Sacos de 25 Kg y 10 Kg



ADVERTENCIAS:

- No utilizar para consumo humano la carne de cerdo y bovino hasta 14 días después del último tratamiento y en aves hasta 7 días después del último tratamiento.
- No usar el producto en aves productoras de huevo para consumo humano.
- No deberá ser manejado por personas alérgicas a las penicilinas.
- No se deje al alcance de los niños.
- Conserve el producto en lugar fresco, seco y lejos de la luz solar.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria
- USO VETERINARIO
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
- SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA