

SALINOMICINA®



Registro: Q- 0835-016
Premezcla Anticoccidiana

FÓRMULA:

Cada 1000 g contiene:

Salinomicina.....120 g

Excipiente c.b.p.....1,000 g

INDICACIONES:

Salinomicina está indicada para el tratamiento de coccidias en aves causadas por protozoarios del género *Eimeria* spp., además posee un amplio espectro y es selectivo contra *E. tenella* y *E. acervulina* entre otras coccidias como: *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* y *E. mivati*, que afectan la integridad intestinal de la ave.

USO EN:

Aves (engorda y reproducción).

DOSIS:

AVES (ENGORDA Y REPRODUCCIÓN):

Adicionar 500 g de **Salinomicina** por tonelada de ración, lo que equivale a una concentración de 60 ppm de Salinomicina.

Administrar desde el primer día Salinomicina hasta 5 días del sacrificio.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

ORAL, mezclado en el alimento.

PERIODO DE RETIRO:

- 5 días antes del sacrificio.



PRESENTACIÓN:
Sacos de 25 Kg



ADVERTENCIAS:

- Este producto no es compatible con Tiamulina, Sulfaquinoxalina y Eritromicina.
- No se administre este producto en aves cuya producción de huevo se destine a consumo humano.
- Almacenar en lugares frescos, secos y protéjase del calor excesivo.
- No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria
- **USO VETERINARIO**
- **CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**
- **SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

