

FASCITRION +



Registro Q-7792-129

Desparasitante de amplio espectro, bioestimulante con minerales, vitaminas, aminoácidos y energía.

FÓRMULA:

Cada 100 ml contienen:

Febendazol	6 g
Ivermectina	200 mg
Triclabendazol	12 g
Ácido cítrico	17 mg
Base Glucogenica	94.4 ml
Cloruro de Potasio	9 g
Cloruro de Sodio	21 mg
Dextrosa anhidra	210 mg
D-pantenol	4 mg
Niacinamida	60 mg
Núcleo proteico	5 mg
Piridoxina clorhidrato	4 mg
Sulfato de magnesio	2 mg
Tiamina clorhidrato	30 mg
Vitamina B ₂ riboflavina	6 mg
Vitamina B ₁₂ cianocobalamina	300 mcg
Vitamina Biotina	300 mg
Vitamina A propionato	1'000,000 UI
Vitamina D ₃ colecalciferol	10,000 UI
Vitamina E tocoferol	300 UI
Vehículo, c.s.p	100 ml

USO EN:

Bovinos, equinos, ovinos y caprinos.

INDICACIONES

Desparasitante antihelmintico de amplio espectro que actúa contra, nematodos gastroentericos y pulmonares en sus formas de huevos larvas y adultas. Cestodos o tenias en sus formas de huevo larvas y adultas. Fasciola hepática en sus formas juveniles y adultas.

En los desequilibrios y deficiencias nutricionales, útil en los periodos de stress, favorecedor del desarrollo, convalecencias, pérdida del apetito, deshidratación, animales retrasados, aumento de las defensas orgánicas frente a la infección, vigorizantes en la gestación, lactancia y enfermedades.

Eficaz estimulante del apetito, después de: las vacunaciones, transportes y manejos. Alimentación artificial de lactantes e insuficiencias hepáticas.

DOSIS

BOVINOS, EQUINOS, OVINOS Y CAPRINOS:

1 ml/ 10 kg de peso.

Una sola dosis alcanza a cubrir los requerimientos nutricionales.

Se recomienda repetir el tratamiento de acuerdo con las necesidades y a criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, toma directa.

PERIODO DE RETIRO:

*Carne para consumo humano: 21 días
Leche para consumo humano: 28 días*

PRESENTACIÓN:

1, 5 y 20 litros



ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- No se deje al alcance de los niños y de animales domésticos.
- No sobre dosificar ni exceder el tiempo de dosificación ya que puede presentarse somnolencia o desórdenes del sistema nervioso que desaparecen al suspender el medicamento.
- No administrar este producto en equinos para consumo humano.
- **CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**
- **SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**