Nutrition, Health & Animal Care

"Cuidamos la salud humana a travéz de la salud animal"

FLUNIX 50

Registro SAGARPA Q-7792-040
Antiinflamatorio, analgésico y antipirético no esteroidal inyectable
Meglumina de Flunixin 5%

FÓRMULA:

Cada mL contiene:
Meglumina de flunixin (eq. de flunixin base) ……50.0 mg
Vehículo, c.b.p……1 mL

DESCRIPCIÓN:

FLUNIX 50 es una formulación desarrollada con un antiinflamatorio no esteroidal que se puede aplicar en cualquier etapa del ciclo de producción pues no interfiere con la gestación, no produce inmunosupresión ni interfiere en la lactación en bovinos, equinos yporcinos.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de la inflamación y el dolor asociado a padecimientos respiratorios, septicemias, metritis, cólicos y alteraciones asociadas a trastornos múculo-esqueleticos, así como coadyuvante en el tratamiento de mastitis y diarrea en bovinos.



USO EN:

Bovinos productores de carne y leche, equinos, porcinos y caninos.

DOSIS:

BOVINOS(DE CARNE Y LECHE):

1 a 2 ml / 45 Kg de peso, cada 24 hrs durante 3-5 días.

EQUINOS:

1-2 ml / 45Kg de peso, cada 24 hrs durante 2 días.

PORCINOS:

1-2 ml / 45 Kg de peso, cada 24 hrs durante 3-5 días. (equivalente a 1.1.a 2.2 mg de flunixin base/Kg de peso).

CANINOS:

0.2 ml / 10 Kg de peso, cada 24 hrs durante 3 a 5 días. (equivalente a 1.1 mg de flunixin base/Kg de peso).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular o intravenosa

PRECAUCIONES DE USO:

- Agitar vigorosamente el frasco antes de usar para permitir la mezcla adecuada de la composición. Interrumpir el tratamiento en caso de reacción alérgica.
- No manipular el producto en caso de hipersensibilidad.

Farmacom de México, SA de CV
Nutrition, Health and Animal Care
Alfonso Reyes 404, El Zapote del Valle,
Tlajomulco de Zúñiga Jal. Méx. C.P 45659
Tel: +52 (33) 3696 0305 y 3696 0306

Para más información de nuestros productos:

33 3114 7767

ventas@ farmacomdemexico.com
farmacovigilancia:
contacto@farmacomdemexico.com
www.farmacomdemexico.com

- En caso de inyección accidental o de la aparición de signos.
- después de la exposición al producto, consulte al médico.
- Lavarse las manos después de manipular el producto.

TIEMPO DE RETIRO:

No consumir la carne de animales tratados hasta 7 días en bovinos y después de 21 días en porcinos.

No consumir la leche de animales tratados hasta 24 hrs. después de la última aplicación.

PRESENTACIÓN:
100 ML Y 250 ML

ADVERTENCIAS:

- **No administrar a caballos con historial de hipersensibilidad al FLUNIX 50**
- **No administrar a equinos destinados al consumo humano.**
- **Evitar la inyección intraarterial a equinos, ya que pueden presentar reacciones adversas tales como: Incoordinación, hiperventilación, histeria y debilidad muscular. Estos signos son pasajeros y desaparecen sin la necesidad de tratamiento.**
- **No exceder la dosis recomendada.**
- **No mezclar con otras substancias en la misma jeringa.**
- **La causa de la inflamación, del dolor o del cólico debe ser determinada y tratada paralelamente con la terapia adecuada.**
- **Manténgase en lugar fresco, seco y protegido de la luz.**
- **No se deje al alcance de los niños.**
- **CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO**
- **SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**
- **Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.**

Farmacom de México, SA de CV
Nutrition, Health and Animal Care
Alfonso Reyes 404, El Zapote del Valle,
Tlajomulco de Zúñiga Jal. Méx. C.P 45659
Tel: +52 (33) 3696 0305 y 3696 0306

Para más información de nuestros productos:

33 3114 7767

ventas@ farmacomdemexico.com
farmacovigilancia:
contacto@farmacomdemexico.com
www.farmacomdemexico.com