

"Cuidamos la Salud Humana a través de la Salud Animal"



Registro: Q-7792-052 Macrólido en solución inyectable Tulatromicina al 10% USO VETERINARIO

FÓRMULA:

Cada 1 mL contiene:

Tulatromicina...... 100 mg Vehículo, c.b.p......1 mL

DESCRIPCIÓN:

Filaxxin® Es una solución inyectable formulada a base de Tulatromicina; macrólido semisintético, bacteriostático de acción prolongada, alta biodisponibilidad y aplicación única.

Los macrólidos son antibióticos con acción bacteriostática e inhiben la biosíntesis esencial de la proteína de la unión selectiva del RNA ribosomal bacteriano.

DOSIS:

BOVINOS:

Administrar 2.5 mg / kilo de peso (1 ml / 40kg de peso).

PORCINOS:

Administrar 2.5 mg / kilo de peso (1 ml / 40kg de peso).



USO EN:

Bovinos (productores de carne y leche) y porcinos

INDICACIONES:

BOVINOS:

En el tratamiento de enfermedades del Complejo Respiratorio Bovino (CRB) asociada con *Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni* y *Mycoplasma bovis.*

Así como para el tratamiento de Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina (QIB) causada por *Moraxella bovis*.

Y en afecciones podales como Pododermatitis Interdigital (Gabarro) causada por *Fusobacterium necrophorum* y *Porphyromonas levii*.

PORCINOS:

Para el tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino (CRP) asociadas con *Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica* y *Glaesserella parasuis* (Haemophilus).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Bovinos, subcutánea en la tabla del cuello. Porcinos, intramuscular.

Para más información de nuestros productos:





"Cuidamos la Salud Humana a través de la Salud Animal"

PERIODO DE RETIRO:

El periodo de retiro es de 5 días antes del sacrificio.

PRESENTACIÓN: 100, 250 y 500 ml

ADVERTENCIAS:

- En caso de hipersensibilidad a los antibióticos macrólidos, limite su uso.
- En vacas productoras de leche para consumo humano, no se recomienda su uso.
- No administrar simultáneamente con antimicrobianos con un modo de acción similar ni con otros macrólidos o lincosamidas.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa, a una temperatura no mayor a los 35 °C.
- Bovinos: No administrar más de 7.5 ml en el mismo sitio de aplicación.
- Porcinos; No administrar más de 2.5 ml en el mismo sitio de aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
- SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.