

TARGET GOLD PREMIX

Registro: Q-7792-037
 Premezcla Endectocida oral de amplio espectro
 Ivermectina 1%



USO EN
 Porcinos (lechones, engorda y adultos).

FÓRMULA:

- Cada 100 g contienen:
- Ivermectina1.0 g
- Excipiente c. b. p.100 g

DESCRIPCIÓN

TARGET GOLD PREMIX® es una premezcla Endectocida avanzada de amplio espectro, para el tratamiento y control de parásitos internos y externos de los cerdos, la cual puede ser utilizada en todas las etapas en los lechones y reproductoras siendo muy seguro en las mismas.

TARGET GOLD PREMIX® posee tecnología granulométrica homogénea, facilitando la mezcla con la ración, no alterando su palatabilidad y sin causar estrés a los animales. Produciendo economía en tiempo y mano de obra.

El uso de TARGET GOLD PREMIX® permite la desparasitación de gusanos redondos internos, además de ser un buen ectoparasiticida, es decir posee un excelente efecto contra la sarna. Lo que provoca un mejor y mayor aumento de peso, rindiendo mayores beneficios al productor.

INDICACIONES

Para el tratamiento y control de endoparásitos y ectoparásitos en porcinos en todas las etapas.

ENDOPARÁSITOS:

Gastrointestinales: *Ascaris suum* (adultos e inmaduros)
Ascarops strongylina (adultos), *Hyostrogylus rubidus* (Adultos e inmaduros), *Oesophagostomum spp.*
Pulmonares: *Metastrongylus spp.* (adultos);
Renales: *Stephanurus dentatus* (adultos e inmaduros).

ECTOPARÁSITOS:

Piojos: *Haematophinus suis*;
 Ácaros: *Sarcoptes, scabiei var. Suis.*
 Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei var. suis.*

DOSIS

100 mcg Ivermectina / Kg de peso por día. Cerdos de hasta 40 Kg: 200 g de TARGET GOLD PREMIX® por tonelada de alimento (equivalente a 100 µg / Kg de pv), para 500 animales, por 7 días consecutivos.

Cerdos de 40-70 Kg: 240 g de TARGET GOLD PREMIX® por tonelada de alimento. (equivalente a 100 µg / Kg de pv), por 7 días consecutivos.

Cerdos de 71-100 Kg: 270 g de TARGET GOLD PREMIX® por tonelada de alimento (equivalente a 100 µg / Kg de pv), por 7 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, mezclado en el alimento del animal.

PRESENTACIÓN:
Saco de 5, 10 y 25 kg

PERIODO DE RETIRO

No administre este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

ADVERTENCIAS:

- Prohibido el uso de este producto en el control de la garrapata *Boophilus* spp. Debido a la toxicidad que representa la Ivermectina a los organismos acuáticos los envases y sus residuos deberán desecharse en forma segura, incinerándolos y/o enterrándolos.
- Recipientes vacíos y cualquier contenido residual debe ser desechado en forma segura (enterrándolos en un lugar apropiado o incinerándolo), ya que la ivermectina libre puede afectar en forma adversa a peces y ciertos organismos acuáticos.
- Conserve el producto en lugar fresco, y seco al abrigo de la luz solar.
- No se deje al alcance de los niños.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
- Consulte al médico veterinario
- Su venta requiere receta médica