

TILOXICAP 22%



Registro Q- 7792-075
Premezcla Antimicrobiana
Tilosina Tartrato 22%

FÓRMULA:

Cada 100 g contienen:

- Tilosina tartrato..... 220 g
- Excipiente, c.b.p..... 1000 g

USO EN:

Porcinos, Aves (pollo engorda y gallina de postura fuera de producción).

DOSIS:

CERDOS:

3 a 7 mg/Kg de peso.

Crecimiento: 400 g - 1.2 Kg de TYLOXICAP 22% /ton de alimento (equivalente a 88 - 264 ppm de Tilosina);

Desarrollo: 367 a 840 g de TYLOXICAP 22% /ton de alimento (equivalente a 81.0 - 185.0 ppm de Tilosina);

Finalización: 362 g - 1.17 Kg de TYLOXICAP 22%/ton de alimento (equivalente a 80.0- 257.0 ppm de Tilosina), durante 21 días.

AVES:

30 mg/ kg de peso.

1.140 kg de TYLOXICAP 22%/ton de alimento (equivalente a 250 ppm de Tilosina), durante 5 días.

DESCRIPCIÓN:

Antibiótico de amplio espectro.
Con especial acción sobre *Mycoplasma gallisepticum*.
También actúa sobre algunos Gram negativos.

Las bacterias sensibles a la Tilosina en los cerdos son principalmente *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Salmonella spp*, *Staphylococcus spp*, *Erysipelotrix rhusiopathiae*, *Escherichia coli*, *Spherophorus necrophorus*, *Chlamydia spp*, *Lawsonia intracelularis*.

En aves actúa contra enfermedades respiratorias del tipo crónica por *Mycoplasma gallinarum* y *Mycoplasma sinoviae*, *E. tenella* y otros como *S. pneumoniae*, *Neisseria spp*, *Haemophilus spp* y *Serpulina hyodysenterialis*.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento balanceado

PRESENTACIÓN:

Sacos de 10 y 25 Kg

PERIODO DE RETIRO:

Suspenda el tratamiento 14 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

IMPORTANTE:

Los consumos diarios de alimento son muy variables, de acuerdo con la especie, etapa productiva, condiciones climáticas, enfermedades, entre otros factores.

La dosis debe estimarse, en la manera de lo posible, con base en el consumo actual de cada caseta o nave, junto con los kg totales de animales a ser medicados y con la dosis correspondiente del principio activo (mg/ kg de peso).



ADVERTENCIAS:

- Mezcle uniformemente en el alimento balanceado.
- No se administre en aves de postura en producción de huevo para consumo humano.
- Consérvese en lugar fresco y seco sobre tarimas. No se deje al alcance de los niños o animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

