



ENROTRYL 20%

Registro: Q-7792-009
Antibiótico de amplio espectro
Enrofloxacin 20%

FÓRMULA

Cada 100 ml contiene:

Enrofloxacin	20.0 g
Vehículo, c.b.p.	100 ml

Frasco 1lt, Bidón 5 y 20 lt

DESCRIPCIÓN

ENROTRYL 20%[®] es una formulación a base de Enrofloxacin para ser administrada por vía oral, mezclada en un vehículo estable para obtener una concentración al 20% de Enrofloxacin, la cual es una de las Quinolonas que actúa inhibiendo la ADN GIRASA, una enzima imprescindible en el desarrollo y reproducción de los microorganismos; la inhibición de la ADN GIRASA impide que se desdoble y replique el ADN bacteriano, además afecta procesos esenciales de la bacteria; condición irreversible que incluye con la muerte bacteriana.

ENROTRYL 20%[®] es una solución muy estable, con buena disolución en agua sin riesgo de obstruir canales y bebederos, en condiciones de dureza y pH normales.

USO EN:
AVES



INDICACIONES

Esta especialmente indicado para los tratamientos de enfermedades respiratorias y entéricas causadas por bacterias Gram (-) y Gram (+) como: *E. coli*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* y *Clostridium spp.*) y *Mycoplasmas spp.*

Para pollos se recomienda un tratamiento metafiláctico al día 3 de vida, como tratamiento preventivo para micoplasmosis y colibacilosis aviar durante 3 a 5 días cuando se trate por infecciones por *Salmonella*.

COMPATIBILIDAD:

Enrotryl 20%[®] se puede administrar conjuntamente con los programas de control de coccidiosis, tratamientos antiprotozoarios y programas de vacunación.

DOSIS

GENERAL:

20mg/ kg de peso vivo del animal.
Las dosis recomendadas son de 500 ppm **ENROTRYL 20%[®]**, en el agua de bebida.

PREVENTIVA:

500 ml de **ENROTRYL 20%[®]** /1000 litros de agua de bebida.

CURATIVA:

1 litro de **ENROTRYL 20%[®]** /1000 lt de agua de bebida

TIEMPO DE RETIRO

No se administre este producto 7 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

No utilizar para consumo humano los huevos procedentes de aves tratadas con este producto hasta 5 días después del último tratamiento.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida.

CONTRAINDICACIONES

No administrar junto con antibacterianos bacteriostáticos (tetraciclinas), ni con sustancias que contengan Magnesio o Aluminio que puedan reducir la absorción de la Enrofloxacin. Las quinolonas no deben ser usadas en asociación con antiinflamatorios no esteroides (AINES).

La combinación de Fluoroquinolonas y los AINES pueden causar ataques en algunos animales.

ADVERTENCIAS

- Conserve el producto en un lugar fresco y seco, no expuesto a la luz..
- No se deje al alcance de los niños y de animales domésticos.
- SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.