

NORFLOCOM 20%

Registro Q-7792-085
Antibiótico de amplio espectro en solución oral para el agua de bebida

FÓRMULA:

Cada 100 ml contienen:

- Norfloxacin..... 20 g •
- Vehículo, c.b.p..... 100 ml

INDICACIONES

NORFLOCOM 20%[®] está indicado en el tratamiento y control de enfermedades causadas por gérmenes con sensibilidad a la Norfloxacin.

AVES:

Escherichia coli (colibacilosis aviar), *Haemophilus gallinarum* (cólera aviar), *Mycoplasma gallisepticum* (micoplasmósís aviar), *Mycoplasma synoviae* (Sinovitis infecciosa), *Pseudomonas aureoginosa*, *Salmonella sp.*, *Staphylococcus aureus* y especies de *Streptococcus*.

CERDOS:

Para el tratamiento de diarreas causadas por *Escherichia coli*, Enterococos, *Proteus*, *Salmonella*, *Shigella*.

USO EN:
Aves y cerdos.



DESCRIPCION

NORFLOCOM 20%[®] es una formulación antibiótica para uso oral, elaborado a base de Norfloxacin un antibacteriano del grupo de las quinolonas con un amplio espectro, gracias al diseño y tecnología de su vehículo, está diseñado especialmente para aportar una rápida acción frente al tratamiento de infecciones bacterianas en aves y cerdos.

DOSIS

General: 12 mg del activo/ Kg de peso.

250 ml de **NORFLOCOM 20%[®]** por cada 1,000 Lt de agua de bebida, por 3 a 5 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, disuelto en el agua de bebida.

PERIODO DE RETIRO

No debe usar este producto 8 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

CONTRAINDICACIONES

No emplear en animales sensibilizados a los salicilatos u otros AINEs, úlceras o hemorragias gastrointestinales, problemas de coagulación sanguínea, insuficiencia hepática o renal, por tanto, deberán evitar su administración. El personal encargado de la administración deberá usar mascarillas y guantes.

PRECAUCIONES

A fin de asegurar una dosificación correcta, la concentración del producto deberá ser ajustada considerando el consumo diario de agua.

En el agua de bebida: mezclar el producto preparando soluciones frescas diariamente, a fin de asegurar una dosificación correcta, la concentración del producto deberá ser ajustada considerando el consumo diario de agua.

La mezcla en la ración deberá ser preparada al día de su administración. El producto deberá ser utilizado dentro de las 24 hrs. de su preparación. Se deberá asegurar que los animales tengan libre acceso al agua medicada. Se debe evitar el acceso a otras fuentes de bebida mientras los animales se encuentren bajo medicación.

La bebida medicada no utilizada después del plazo recomendado deberá ser desechada. Al final del tratamiento el sistema para suministro medicado debe ser limpiado adecuadamente a fin de evitar la ingestión de cantidades restantes.

Se deben inutilizar los envases una vez empleada la totalidad del producto.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales: Usar cubre bocas y guantes.

Período de validez: 2.5 años.

Precauciones especiales de conservación: Mantener el producto en un lugar fresco y protegido de la luz.

Precauciones especiales para la eliminación del medicamento no usado: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes en materia ambiental.

PRESENTACIÓN:
BIDÓN
5 y 20 lt

ADVERTENCIAS:

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria
- Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
- Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
- SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA