

# AMOXI 500 PROTEC

Registro: Q-7792-073  
Antibiótico de amplio espectro en POLVO SOLUBLE  
Amoxicilina trihidratada 50%

## FÓRMULA

Cada 1000 g contiene:

Amoxicilina trihidratada	500.0 g
Excipiente, c.b.p.	1000.0 g

## DESCRIPCIÓN

**AMOXI 500 PROTEC®** es un antibacteriano que inhibe la acción de peptidasas y carboxipeptidasas impidiendo la síntesis de la pared celular bacteriana.

## INDICACIONES

**AMOXI 500 PROTEC®** está indicado para el control y tratamiento de enfermedades respiratorias, digestivas y productivas de los cerdos, aves y bovinos provocadas por bacterias Gram (+) y Gram (-).

## DOSIS

### DOSIS GENERAL:

10 a 20 mg/ kg de peso vivo.

### PORCINOS:

400 a 800 g de **AMOXI 500 PROTEC®** por cada 1000 L de agua de bebida (200 a 400 ppm de amoxicilina), durante 4 o 5 días.

### AVES (ENGORDA Y POSTURA):

400 a 800 g de **AMOXI 500 PROTEC®** por cada 1000 L de agua de bebida (200 a 400 ppm de amoxicilina) durante 3 a 5 días

### BOVINOS (BECERROS):

Adicionar en la leche o en el agua de bebida una dosis equivalente a 8.8 mg de amoxicilina/Kg de peso vivo, dos veces al día durante 5 días.

Importante: los consumos diarios de agua de bebida son muy variables, de acuerdo con la especie, etapa productiva, condiciones climáticas, enfermedades, entre otros factores.

La dosis debe estimarse, en la manera de lo posible, con base en el consumo actual de cada caseta o nave, junto con los kg totales de animales a ser medicados

Previo a la dosificación en agua deberá verificar que el producto sea **AMOXI 500 PROTEC®** en polvo soluble.



### USO EN:

**BOVINOS** (becerros), **PORCINOS** y **AVES** (engorda y postura).

Saco 10 y 25 Kg

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, disuelto en el agua de bebida.

## PERIODO DE RETIRO

No utilizar para consumo humano la carne de cerdo y bovino hasta 14 días después del último tratamiento y en aves hasta 7 días después del último tratamiento.

### ADVERTENCIAS

- No administrarse en gallinas que produzcan huevo para consumo humano.
- Mantenga el producto en un lugar fresco, seco, sobre tarimas y protegido de la luz solar directa, a una temperatura no mayor de 30°C.
- No se deje al alcance de los niños y de animales domésticos.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.
- SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA
- CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.